Моделирование метаболических путей

Плюснина Татьяна Юрьевна
Доц-т каф. биофизики
Биологического ф-та МГУ

Метаболизм (от греч. μεταβολή — «превращение, изменение»), — набор химических реакций, которые протекают в живом организме и способствуют поддержанию жизни.

Метаболический путь — совокупность метаболических реакций

Метаболиты — субстраты и продукты, участвующие в реакциях

Организация клеточного метаболизма

Цели и задачи метаболического моделирования

Научные задачи:

- исследование механизмов клеточной регуляции
- объяснение экспериментально установленных фактов
- предсказание новых характеристик внутриклеточных процессов
- систематизация накопленных экспериментальных данных

Биоинженерные задачи:

- получение необходимых веществ из бактериальных клеток и других организмов
 - разработка новых лекарств
 - получение биотоплива
- разработка новых штаммов с наперед заданными свойствами

Уровни исследования метаболических реакций

In vitro

свойства отдельных метаболитов и их динамика

In vivo

описание характеристик метаболизма клетки в целом

In silico

построение «электронной клетки»

Разные уровни сложности организации клеток

Клетка эукариот

Клеточные процессы локализованы в разных компартментах

Первые модели – модели клеток прокариот

Клетка прокариот

Все процессы протекают в одном компартменте

Escherichia coli

http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/49477C30-0513-47BE-88FC-17974CB1F952/0/e_coli.jpg

Escherichia coli – удобный объект для моделирования
клеточного метаболизма

Метаболические пути *Escherichia coli*

центральные метаболические пути

- > 800 метаболических процессов
- > 400 метаболитов
- > 500 ферментов

Описание метаболизма включает:

- потребление необходимых для роста веществ из среды (мембранные транспортные процессы)
- центральные катаболические пути
- биосинтетические пути (продукция всех компонент биомассы)

Построение метаболической модели:

реконструкция метаболических путей:

построение общей схемы метаболических путей

математическое описание:

вывод уравнений скорости и построение системы уравнений в соответствии с метаболической картой

Реконструкция метаболических путей

Metabolic Reconstruction

Structural Genomics

Геном

(совокупность генов)

Протеом

(совокупность белков)

Метаболом

(совокупность
метаболических реакций)

Пример аминокислотной последовательности

MAALTRDPQFQKLQQWYREHRSELNLRRLFDANKDRFNHFSLTNTNHHILVDYSKNLVTEDVMRMLVDLAKSRGVEAA
RERMFNGEKINYTEGRAVLHVALRNRSNTPILVDGKDVMPVNVKVLDDKMKSFQQRVRSQDWKGYTGKTITDVINIGIGGSD
LGPLMVTEALKPYSSGGPRVWVYSNIDGTHIAKTLAQLNPESLFIASKTFTTQETITNAETAKEWFLQAADPSAVA
KHFVALSTNTTKVKEFGIDPQNMFEFWDWVGGRYSLWSAIGLSIALHVGFDNFEQLLSGAHWMDQHFRTTPEKNAPVLL
ALLGIWYINCFGCETHAMLPYDQYLHRFAAYFQQGDMESNGKYITKSGTRVDHQTGPVWGEPTNGQHAFYQLIHQGT
KMIPCDFLIPVQTQHPHPIRKLHHLKILLANFLAQTEALMRGKSTEEARKELQAAGKSPEDLERLLPHKVFEGNRPTNSIVFT
KLTPFMLGALVAMYEHKIFVQGIWDINSFDQWGVELGKQLAKKIEPELDGSAQVTSHDASTNGLINFIKQQREARVQ

BLAST База данных по сравнению последовательностей

Accession	Description	Max score	Total score	Query coverage	E value	Links
AAT25115.1	Homo sapiens glucose phosphate isomerase [synthetic construct]	1153	1158	100%	0.0	
NP_002186.2	glucose-6-phosphate isomerase isoform 2 [Homo sapiens] >sp P06	1153	1169	100%	0.0	U G M
I3L1.A	Chain A, Human Glucose-6-Phosphate Isomerase >pdb 1LH1 B Cha	1152	1167	100%	0.0	S
AAT22445.1	sperms antigen-36 [Homo sapiens]	1152	1167	100%	0.0	
I3L1.A	Chain A, Crystal Structure Of Human Phosphoglucose Isomerase	1151	1186	99%	0.0	S
AAA36155.1	neuroleukin [Homo sapiens] >gb AAB3602.1 glucose phosphate i	1151	1185	100%	0.0	G
NP_001120304.1	glucose-6-phosphate isomerase [Pongo abeli] >sp Q5R4E3.1 G6PI	1130	1138	100%	0.0	G M
Q8E9L3	RacName: Fu8=Glucose-6-phosphate isomerase; Short=GPI; AltName	1131	1158	100%	0.0	
NP_001073534.1	glucose-6-phosphate isomerase [Tryctolagus cuniculus] >sp Q9N1	1105	1100	100%	0.0	U G M
NP_022485.1	glucose-6-phosphate isomerase [Sus scrofa] >sp P08059.2 G6PI_	1093	1099	100%	0.0	U G M
I3E1.A	Chain A, The Crystal Structure Of Phosphoglucose Isomerase From	1088	1088	99%	0.0	S
I3E0.A	Chain A, Crystal Structure Analysis Of Rabbit Phosphoglucose Iso	1090	1098	100%	0.0	S
I3E0.A	Chain A, Crystal Structure Of Pig Phosphoglucose Isomerase >pdb	1089	1088	99%	0.0	S
NP_001171881.1	glucose-6-phosphate isomerase isoform 1 [Homo sapiens] >db ISA	1082	1087	100%	0.0	U G M
BA026947.1	unannotated version: nri047? Takara (scans=1)	1096	1096	100%	0.0	I

фермент, соответствующий выбранной последовательности

glucose-6-phosphate isomerase

реакция, катализируемая ферментом

определение всех реакций
метаболического пути

KEGG База данных по метаболическим путям

GLYCOLYSIS / GLUCONEOGENESIS

MetaCyc База данных по метаболическим путям

MetaCyc Pathway: glycolysis I

Enzyme View:

Представление скорости реакции

В соответствии с законом действующих масс

(скорость реакции пропорциональна вероятности столкновения реагентов, а вероятность в свою очередь пропорциональна концентрации реагентов с учетом молекулярности реакции)

$$v = k_1 S_1 S_2 - k_{-1} P^2 = v_+ - v_-$$

v - общая скорость реакции
 v_+ - скорость прямой реакции
 v_- - скорость обратной реакции

В общем виде:

$$v = v_+ - v_- = k_+ \prod_i S_i^{m_i} - k_- \prod_j P_j^{m_j}$$

m_i и m_j соответствуют молекулярности S_i и P_j

Скорость реакции может быть выражена как через **концентрации** реагирующих веществ, так и в виде баланса **скоростей** прямых и обратных реакций.

Типы метаболических моделей

кинетические модели – системы ОДУ

- переменная модели – концентрация метаболита
- описание отдельных метаболических путей
- решение модели – динамическое поведение метаболитов во времени
- (~10-50 уравнений, ~100-500 параметров)

стехиометрические (потоковые) модели – системы линейных алгебраических уравнений

- переменная модели – метаболический поток
- описание метаболизма целой клетки
- решение модели – стационарное распределение метаболических потоков
- (~100-1000 уравнений)

Стехиометрические модели

Стехиометрические коэффициенты

Стехиометрические коэффициенты обозначают пропорции субстратов и продуктов, участвующих в реакции.

Стехиометрические коэффициенты для S_1 , S_2 и P : -1, -1 и 2.

Набор стехиометрических коэффициентов не единственен:

если считать, что для получения одного моля используется по половине моля каждого субстрата S_1 и S_2 , можно записать: -1/2, -1/2 и 1;

или если изменить направление реакции, тогда можно записать: 1, 1 и -2.

Стехиометрическая матрица

Стехиометрические коэффициенты n_{ij} , соответствующие метаболиту S_i и реакции v_j могут быть объединены в стехиометрическую матрицу:

$$N = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_r \\ n_{11} & n_{12} & \dots & n_{1r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ n_{m1} & n_{m2} & \dots & n_{mr} \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ \\ \\ S_m \end{matrix}$$

$$\mathbf{N} = \{n_{ij}\}, \\ i = 1, \dots, m ; j = 1, \dots, r$$

каждый столбец соответствует реакции (r реакций)

каждая строка соответствует метаболиту (m метаболитов)

Стехиометрическая матрица

для реакции v_2 :

$$N = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & S_1 & S_2 & S_3 & \end{matrix}$$

Строка 1: 1 молекула S_1 расходуется (-1)
Строка 2: 2 молекулы S_2 образуются (2)
Строка 3: S_3 в этой реакции не участвует (0)

Реакции метаболической сети могут быть обратимы.

Чтобы определить знак коэффициентов, направление стрелок искусственно выбирается как положительное «слева направо» и «сверху вниз».

Построить стехиометрическую матрицу

Построить стехиометрическую матрицу

$$N = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Построить стехиометрическую матрицу

Построить стехиометрическую матрицу

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Построение уравнений баланса

$$S = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

вектор
метаболитов

вектор
скоростей

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

стехиометрическая
матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{dS_1}{dt} \\ \frac{dS_2}{dt} \\ \frac{dS_3}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot v_1 - 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 - 1 \cdot v_4 \\ 0 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 - 1 \cdot v_3 + 0 \cdot v_4 \\ 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 + 1 \cdot v_4 \end{pmatrix}$$

уравнения баланса

Записать уравнения баланса

Записать уравнения баланса

$$\begin{pmatrix} \frac{dS_1}{dt} \\ \frac{dS_2}{dt} \\ \frac{dS_3}{dt} \\ \frac{dS_4}{dt} \\ \frac{dS_5}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (v_1) = \begin{pmatrix} -v_1 \\ -v_1 \\ -v_1 \\ v_1 \\ v_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dS_1}{dt} \\ \frac{dS_2}{dt} \\ \frac{dS_3}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 - v_2 - v_3 \\ -v_2 + v_3 \\ v_2 - v_3 \end{pmatrix}$$

Записать уравнения баланса

Записать уравнения баланса

$$\begin{pmatrix} \frac{dS_1}{dt} \\ \frac{dS_2}{dt} \\ \frac{dS_3}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 - v_2 - v_3 \\ -v_2 + v_3 \\ v_2 - v_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dS_1}{dt} \\ \frac{dS_2}{dt} \\ \frac{dS_3}{dt} \\ \frac{dS_4}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 - v_2 \\ -v_3 + v_4 \\ v_3 - v_4 \\ v_5 \end{pmatrix}$$

Построение стехиометрической модели

$$S = (S_1, S_2, \dots, S_n)^T$$

вектор концентраций метаболитов

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$$

вектор скоростей реакций

N

стехиометрическая матрица

$$\frac{dS}{dt} = Nv$$

уравнения баланса

$$\frac{dS}{dt} = 0$$

стационарное состояние

$$Nv = 0$$

система алгебраических уравнений

Гипотетическая схема метаболических потоков

Метаболиты

внешние:

A_e , F_e

внутренние:

A , B , C , E , F , – в цитоплазме

B_m , D_m , E_m – в митохондрии

C_c , E_c , F_c – в хлоропласте

Процессы

транспорт через внешнюю мембрану:

v_1 , v_{14}

транспорт через внутренние мембраны:

v_3 , v_8 – через мембрану митохондрии

v_9 , v_{10} , v_{11} , v_{13} – через мембрану хлоропласта

реакции превращения субстрата в продукт

v_4 , v_5 , v_6 , v_7 , v_{12}

Гипотетическая схема метаболических потоков

для метаболита В:

$$\frac{dX_B}{dt} = v_2 - v_3$$

(Общая скорость образования метаболита В) =
= (скорость образования В) – (скорость потребления В)

Метаболический поток – нормированная скорость реакции.

Размерность потока – моль/ед.биомассы/время.

В матричном виде систему дифференциальных уравнений можно записать как :

$$\begin{array}{l}
 \frac{dX_A}{dt} = v_1 - v_2 \\
 \frac{dX_B}{dt} = v_2 - v_3 \\
 \frac{dX_{B_m}}{dt} = v_3 - v_4 + v_7 \\
 \frac{dX_C}{dt} = v_2 - v_{10} \\
 \frac{dX_{C_e}}{dt} = v_{11} - v_{12} \\
 \vdots \\
 \frac{dX_F}{dt} = v_{13} - v_{14} \\
 \frac{dX_{F_e}}{dt} = v_{12} - v_{13}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{In matrix form}}
 \begin{array}{l}
 \left[\begin{array}{c}
 \frac{dX_A}{dt} \\
 \frac{dX_B}{dt} \\
 \frac{dX_{B_m}}{dt} \\
 \frac{dX_C}{dt} \\
 \frac{dX_{C_e}}{dt} \\
 \vdots \\
 \frac{dX_F}{dt} \\
 \frac{dX_{F_e}}{dt}
 \end{array} \right]_{m=1}
 =
 \begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccccccccccccccc}
 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0
 \end{array} \right]_{m \times r}
 \cdot
 \left[\begin{array}{c}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5 \\
 \vdots \\
 v_{13} \\
 v_{14}
 \end{array} \right]_{r=1}
 \end{array}
 \end{array}$$

n_{ij} — число молекул i -го метаболита, вступающего в j -ю реакцию

v_{ij} — скорость j -й реакции, в которой участвует i -й метаболит

$$\frac{dX}{dt} = Nv \quad Nv = 0$$

Размерность N в общем виде можно записать $m \times r$,
 m — это число метаболитов, участвующих в реакциях,
 r — число реакций.

Соотношение числа метаболитов m и числа потоков r

В условиях стационарного состояния: $Nv = 0$

m – количество уравнений

r – количество переменных

Возможны три варианта:

1. $m = r$ полностью определенная система. Решение единственно.

2. $m < r$ недоопределенная система.

Означает, что недостаточно уравнений баланса для определения всех потоков. Система уравнений может иметь бесконечное число решений.

(Наиболее часто встречаемый случай)

Используется **метод линейного программирования.**

3. $m > r$ переопределенная система.

В случае, когда доступно множество экспериментальных измерений.

Решается методом псевдо-инверсий Мура-Пенроуза (Moore–Penrose)

Постановка задачи линейного программирования для метаболической сети

(Метод анализа стационарных потоков, **Flux Balance Analysis, FBA**)

I. Определить пространство решений:

- Уравнения баланса массы для всех метаболитов.

$$Nv = 0$$

- Ограничения на потоки - максимальные и минимальные значения потоков (если известно).

$$\alpha_i \leq v_i \leq \beta_i$$

II. Определить целевую функцию.

$$z = \sum_j c_{ij} v_j$$

Поиск оптимального решения

Задача линейного программирования

Пример:

максимизировать $x_1 + 2x_2$ ← Целевая функция

при условии:

$$x_1 - x_2 - 2 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 - 5 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Ограничения
(пространство решений)

Выбор целевой функции

Целевая функция определяется:

1. биологическими потребностями клетки,
2. биотехнологической задачей.

Примеры целевой функции:

- 1. Максимизировать биомассу.**
2. Минимизировать поток питательных веществ из среды.
3. Максимизировать продукцию определенного метаболита.
4. Максимизировать продукцию АТФ.

Расчет биомассы

Metabolic requirements for the production of 1 g of *E. coli* cells, from Ingraham *et al.* (1983).

Расчет биомассы:

a_1 белок + a_2 углеводы + a_3 липиды + a_4 ДНК + a_5 РНК + b АТФ $\rightarrow$
 $\rightarrow$ c биомассы + b АДФ + продукты

Анализ стационарных потоков

http://www.nature.com/nbt/web_extras/supp_info/nbt0201_125/info_frame.html

Gene	Enzyme	Flux
Gene ₁	A Transporter	R ₁
Gene ₂	Enzyme ₂	R ₂
Gene ₃	Enzyme ₃	R ₃
Gene ₄	D Transporter	R ₄
Gene ₅	Enzyme ₅	R ₅
Gene ₆	Enzyme ₆	R ₆
Gene ₇	F Transporter	R ₇
Gene ₈	Enzyme ₈	R ₈
Gene ₉	Enzyme ₉	R ₉
Gene ₁₀	H Transporter	R ₁₀
-	A Exchange	A _{xt}
-	D Exchange	D _{xt}
-	F Exchange	F _{xt}
-	H Exchange	H _{xt}

Выписываем все метаболические потоки

Анализ стационарных потоков

http://www.nature.com/nbt/web_extras/supp_info/nbt0201_125/info_frame.html

Выписываем все метаболиты и объединяем их в схему

Анализ стационарных потоков

http://www.nature.com/nbt/web_extras/supp_info/nbt0201_125/info_frame.html

Как записать поток на биомассу (V_{growth})?

Анализ стационарных потоков

http://www.nature.com/nbt/web_extras/supp_info/nbt0201_125/info_frame.html

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}	V_m	V_{growth}	A_{xt}	D_{xt}	F_{xt}	H_{xt}
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0
C	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	-2	0	0	0	0
I	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
$A_{external}$	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
$D_{external}$	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
$F_{external}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
$H_{external}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \\ R_6 \\ R_7 \\ R_8 \\ R_9 \\ R_{10} \\ V_m \\ V_{growth} \\ A_{xt} \\ D_{xt} \\ F_{xt} \\ H_{xt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

На формирование биомассы, V_{growth} ,
идет одна молекула **B** и две молекулы **H**

Анализ стационарных потоков

http://www.nature.com/nbt/web_extras/supp_info/nbt0201_125/info_frame.html

уравнения баланса

ограничения на потоки

целевая функция

$$\text{B: } R_1 - R_2 - R_5 - R_8 - V_{growth} = 0$$

$$\text{C: } 2R_2 - R_3 = 0$$

$$\text{D: } R_3 + R_6 - R_4 = 0$$

$$\text{E: } R_5 - R_6 = 0$$

$$\text{F: } R_6 - R_7 = 0$$

$$\text{G: } R_8 - R_9 = 0$$

$$\text{H: } R_9 - R_{10} - 2V_{growth} = 0$$

$$\text{I: } R_5 - V_m = 0$$

$$\text{A}_{external}: A_{xt} - R_1 = 0$$

$$\text{D}_{external}: D_{xt} + R_4 = 0$$

$$\text{F}_{external}: F_{xt} + R_7 = 0$$

$$\text{H}_{external}: H_{xt} + R_{10} = 0$$

$$0 \leq R_1 \leq \infty$$

$$0 \leq R_2 \leq \infty$$

$$0 \leq R_3 \leq \infty$$

$$0 \leq R_4 \leq \infty$$

$$0 \leq R_5 \leq \infty$$

$$0 \leq R_6 \leq \infty$$

$$0 \leq R_7 \leq \infty$$

$$-\infty \leq R_8 \leq \infty$$

$$0 \leq R_9 \leq \infty$$

$$0 \leq R_{10} \leq \infty$$

$$K_1 \leq V_m \leq K_1$$

$$0 \leq V_{growth} \leq \infty$$

$$Y_2 \leq A_{up} \leq Y_2$$

$$-\infty \leq D_{up} \leq 0$$

$$-\infty \leq F_{up} \leq 0$$

$$-\infty \leq H_{up} \leq 0$$

$$Z = V_{growth} \rightarrow \mathbf{max}$$

Ставим задачу линейного программирования

Применение анализа метаболических путей

Метаболизм *E.coli*

Распределение метаболических потоков для полного набора генов.

Целевая функция – максимум биомассы при росте на глюкозе.

Способность *E.coli* адаптироваться к утрате функциональности гена может быть проанализирована путем удаления гена из основного набора

Распределение метаболических потоков, когда «выключен» ген *sucA*.
(ген *sucA* кодирует необходимый компонент реакции в ЦТК)

Поток перенаправляется через глиоксилатный шунт.
Реакция Succ—SucCoA обращается.

Применение анализа метаболических путей

Метаболизм синезеленых водорослей

- oxidative pentose phosphate flux
- Net CO₂ released by cell
- glyoxylate shunt flux
- Rubisco flux
- PEP carboxylase flux
- biomass yield