





Модели нелинейного мира

www.biophys.msu.ru

Галина Юрьевна Ризниченко

Каф. биофизики Биологического ф-та Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова,
к.119

тел: +7(495)9390289

E-mail: riznich@biophys.msu.ru



Лекция 6 (7)




<http://mathbio.ru/mnw>

Колебательные процессы в биологии

Работа АТФ-азы




До популяций и сообществ



Кривые численности зайца и рыси в Канаде (по К. Вилли, В. Детье, 1974)

Большой пестрый дятел



Erol Başar


Brain Function and Oscillations

II: Integrative Brain Function.
Neurophysiology
and Cognitive Processes





Springer

Биологические и геофизические ритмы




В организме человека
более 300 суточных
ритмов





Периоды от
минуты и
длиннее



Овариальный
цикл развития
яйцеклетки

Как возникают колебания?

- Какими свойствами должна обладать система, чтобы в ней могли возникнуть колебания?

Обратная связь

- **Обратная связь** — это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы.
- Другими словами, на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала)
- Различают положительную и отрицательную обратную связь. Отрицательная обратная связь изменяет входной сигнал таким образом, чтобы противодействовать изменению выходного сигнала. Это делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров.
- Положительная обратная связь, наоборот, усиливает изменение выходного сигнала. Системы с сильной положительной обратной связью проявляют тенденцию к неустойчивости, в них могут возникать незатухающие колебания,


Схема Гудвина

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k_1}{k_1 + z^n} - k_2 x$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2 x - k_3 y$$


$$\frac{dz}{dt} = k_3 y - k_4 z$$

При $n > 8$ – колебания




Brian Carey Goodwin
(1931 – 2009)

Канадский биолог и
биоматематик





Биологические системы — сочетание положительных и отрицательных обратных связей

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$



Автокаталитический член —
положительная обратная связь
Ферхюльстовский член —
отрицательная обратная связь






Модель Вольтерра

При $x - \max$, скорость
роста y $dy/dt - \max$ –

При $y - \max$ – скорость
убыли x $dx/dy - \max$




$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy$$


$$\frac{dy}{dt} = cxy - dy$$

$$a = 1; b = 0.5;$$

$$c = 1; d = 2$$



Предельный цикл



На фазовой плоскости автоколебания изображаются в виде замкнутой изолированной траектории – ПРЕДЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Пример 1

$$\frac{dx}{dt} = y + x[1 - (x^2 + y^2)],$$

$$\frac{dy}{dt} = -x + y[1 - (x^2 + y^2)],$$

Параметрические уравнения предельного цикла

$$x = \cos(t - t_1), \quad y = \sin(t - t_1),$$

Уравнения всех других фазовых траекторий


$$x = \frac{\cos(t - t_0)}{\sqrt{1 + C e^{-2(t-t_0)}}}, \quad y = \frac{\sin(t - t_0)}{\sqrt{1 + C e^{-2(t-t_0)}}}$$

При $C > 0$ фазовые траектории накручиваются на предельный цикл изнутри

При $-1 < C < 0$ фазовые траектории накручиваются на предельный цикл снаружи


Устойчивый предельный цикл

Предельный цикл называется устойчивым, если существует такая область на фазовой плоскости, содержащая этот предельный цикл, — окрестность ε , что все фазовые траектории, начинающиеся в окрестности ε , асимптотически при $t \rightarrow \infty$ приближаются к предельному циклу.




Неустойчивый предельный цикл

Если же, наоборот, в любой сколь угодно малой окрестности ε предельного цикла существует по крайней мере одна фазовая траектория, не приближающаяся к предельному циклу при $t \rightarrow \infty$, то такой предельный цикл называется неустойчивым.



Полуустойчивый предельный цикл


Такие циклы также называют двойными. При некотором значении параметра они расщепляются на два, один из которых устойчив, а другой - неустойчив



Теоремы существования предельного цикла (1)

Теорема 1


Если существует на фазовой плоскости некоторая замкнутая область, такая, что все фазовые траектории, пересекающие границу этой области, входят в нее, и внутри этой области находится неустойчивая особая точка, отличная от седла, то в этой области обязательно имеется хотя бы один предельный цикл




Теоремы существования предельного цикла (2)


Теорема 2

Пусть на фазовой плоскости существует область, из которой фазовые траектории не выходят, и в которой нет положений равновесия (особых точек). Тогда в этой области обязательно существует предельный цикл, причем все остальные траектории обязательно наматываются на него.






ВАЖНО



Предельные циклы возможны
лишь в системе, правые части
которой представлены
нелинейными функциями.

ТОЛЬКО В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ БЫВАЮТ



*Only in **NONLINEAR SYSTEM***

SELFORGANIZATION IN TIME:


1. selfoscillation
2. multistability
3. quasystochastic regimes in deterministic systems

SELFORGANIZATION IN SPACE

1. autowaves
2. dissipative structures
(nonequilibrium steady distributions)
3. stochastic in space regimes



Рождение предельного цикла. Бифуркация Андропова- Хопфа



**Андронов Александр
Александрович (1901-1952)**

**Эберхáрд Фредерíк
Фердинáнд Хóпф
(1902-1983)**

Бифуркация впервые была исследована А.А. Андроновым (1937) для случая $N = 2$ и обобщена Е. Хопфом (1942) на системы с произвольной размерностью. (Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М., Наука, 1981)

Модельная система мягкого возбуждения автоколебаний

$$\frac{dr}{dt} = r (c - r^2),$$

r и φ - полярные
координаты

$$\frac{d\varphi}{dt} = 2\pi.$$

При увеличении параметра c при $c = 0$ фокус теряет устойчивость и рождается предельный цикл

Стационарные решения


$$r(c - r^2) = 0.$$

1. $\bar{r}_1 = 0$

2,3. $c - \bar{r}^2 = 0 \quad \bar{r}_{2,3} = \pm\sqrt{c}$

Имеет реальный смысл


$$\bar{r}_2 = \sqrt{c}$$



Окружность радиуса c


Суперкритическая бифуркация Андронова-Хопфа (мягкое возбуждение)

Устойчивый фокус




$c < 0$

Центр




$c = 0$

Неустойчивый фокус +
устойчивый предельный цикл



$c > 0$

радиус
предельного
цикла



$$\frac{dr}{dt} = r (c - r^2),$$


$$\frac{d\varphi}{dt} = 2\pi.$$

Бифуркационная диаграмма линейной системы

$$\sigma = -(a + d); \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 - 4\Delta}}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d\xi}{dt} &= a\xi + b\eta, \\ \frac{d\eta}{dt} &= c\xi + d\eta. \end{aligned}$$



Модельная система жесткого возбуждения автоколебаний

$$\frac{dr}{dt} = r\left(\frac{c}{4} + r^2 - r^4\right),$$

$$r = 0,$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = 2\pi.$$

$$r^2 = \frac{1}{2} \left[1 \pm (1+c)^{1/2} \right].$$

При $c = -1$ рождается неустойчивый предельный цикл малой амплитуды и устойчивый предельный цикл конечной амплитуды. При $c > -1$ второе стационарное решение – устойчивый предельный цикл. При $-1 < c < 0$ три стационарных решения, добавляется – неустойчивый предельный цикл с амплитудой

$$r^2 = \frac{1}{2} \left[1 - (1+c)^{1/2} \right].$$


При $c > 0$ неустойчивый предельный цикл пропадает

Субкритическая
бифуркация
Андронова –
Хопфа

Устойчивый фокус,
неустойчивый
предельный цикл,
устойчивый
предельный цикл


Неустойчивый фокус,
устойчивый
предельный цикл

Устойчивый
фокус




$$c < -1$$

a



$$-1 < c < 0$$

б



$$c > 0$$

в

$$\frac{dr}{dt} = r\left(\frac{c}{4} + r^2 - r^4\right),$$

$$r^2 = 1 \pm (1 + c)^{1/2}.$$



Ветвь $r = 0$
устойчива при
 $c < 0$ и
неустойчива
при $c > 0$.



Брюсселятор

И. Пригожин, Р. Лефевр (1965)



1917-2003

Простейшая реализация кубической
нелинейности в химической реакции



(тримолекулярная реакция)

Книги И.Р.Пригожина

- *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — М.: ИЛ, 1960. — 150 с.
- *Пригожин И.* Неравновесная статистическая механика. — М.: Мир, 1964. — 314 с.
- *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — Новосибирск: Наука, 1966. — 510 с.
- *Гленсдорф П., Пригожин И.* Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. — М.: Мир, 1973. — 280 с.
- *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. — М.: Мир, 1979. — 512 с.
- *Пригожин И.* Молекулярная теория растворов. — М.: Metallurgia, 1990. — 344 с.
- *Пригожин И., Конденуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.

- *Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках.* — М.: Наука, 1985. — 328 с.
- *Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.* — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.





Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990- 358 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. М.: Прогресс, 1994. — 266 с.

Пригожин И. Конец определенности. — Ижевск: РХД, 2001 - 216 с.

Пригожин И. Определено ли будущее. —Ижевск: ИКИ, 2005 - 240 с.


Схема реакций Брюсселятора (тримолекулярная реакция



Система уравнений

Если конечные продукты C и R удаляются из реакционного пространства, а субстрат A находится в избытке, $k_{-1} = k_{-3} = k_{-4} = 0$. Пусть также $k_{-2} = 0$. Значения остальных констант положим равными единице.


$$\frac{dx}{dt} = A + X^2 Y - (B + 1)X$$




$$\frac{dy}{dt} = BX - X^2 Y.$$

$$\bar{X} = A, \quad \bar{Y} = \frac{B}{A}.$$

Брюсселятор




a




б

Фазовый портрет системы брюсселятор при $V > 1 + A^2$ (a) и $V < 1 + A^2$ (б).



Колебания в гликолизе

Активация



$$\frac{dx}{dt} = k - \chi \frac{x}{(K_{mx} + x)} \frac{y}{(K_{my} + y)}$$

$$\frac{dy}{dt} = \chi \frac{x}{(K_{mx} + x)} \frac{y}{(K_{my} + y)} - q \frac{y}{(K'_{my} + y)}$$

Безразмерные уравнения ГЛИКОЛИЗА

$$\frac{dx}{dt} = 1 - xy,$$

Ф6Ф





$$\frac{dy}{dt} = \alpha y \left(x - \frac{1+r}{1+ry} \right),$$

ФДФ

$$\alpha = \frac{(q-k)^2 K_{mz} K_{my}}{(K'_{my})^2 k \chi}, \quad r = \frac{k}{q+k}.$$







Фазовые портреты и кинетика

Устойчивые узел и фокус



Модель гликолиза (8.10).
Кинетика изменений
концентраций
фруктозо-6-фосфата (x) и
фруктозодифосфата (y)
(справа) и фазовый портрет
системы (слева) при разных
значениях параметров
системы, a —
бесколебательный процесс
(узел на фазовой плоскости),
 $\alpha = 0.25$; $r = 1$. b — затухающие
колебания (устойчивый фокус
на фазовой плоскости),
 $\alpha = 0.25$; $r = 0.2$.

Предельные циклы в гликолизе



v — колебания с постоянной амплитудой и фазой (предельный цикл на фазовой плоскости), $\alpha = 6$; $r = 0.24$. z — релаксационные колебания с постоянной амплитудой и фазой (предельный цикл почти треугольной формы на фазовой плоскости), $\alpha = 8$; $r = 0.5$.

Колебания Кальция в клетках


Клетка	Сtimул	Время между осцилляциями, с	Метод регистрации	Литературный источник
Ацинарные клетки околоушной железы	Карбахолин	5	Фура-2	Gray 1988
Гонадотропные клетки гипофиза	Гонадолиберин	6	"	Shangold ea 1988
Бета клетки поджелудочной железы	Карбахолин	12-25	"	Prentki ea 1988
Гладкомышечные клетки	Фенилэфрин, гистамин	30-48	"	Ambler ea 1988
Фибробласты (REF52)	Вазопрессин + грамицидин	35-100	"	Harootunian ea
Эндотелиальные клетки	Гистамин	40-125	"	Jacob ea 1988
Гепатоциты	Вазопрессин, фенилэфрин, ангиотензин II	18-240	Акворин	Woods ea 1986 Woods ea 1987

Кардиомиоциты	Кофеин	0,3-3	Сокращение	Kort ea 1985
Симпатические нейроны	"	120	Ток K+	Kuba ea 1976
Симпатические нейроны	Деполаризация и кофеин	60-120	Фура-2	Lipscombe ea 1988
Яйцеклетки хомячка	Оплодотворение	55	Акворин	Miysaki ea 1986
Ооциты мыши	Форболовый эфир	17-35	"	Cuthbertson, Cobbold 1985
В-лимфоциты	Антиген	50-75	Фура-2	Wilson ea 1987
Макрофаги	Распластывание	19-69	"	Kruskal, Maxfield 1987
Яйцеклетка хомячка	Тимеросал	300	Ток K+	Swann 1991
Гепатоциты	Желчная кислота	5-12 (1 тип)	"	Capiod ea 1991a
"	цАМФ	60-240 (2 тип)	"	Capiod ea 1991b

T.-J.Kim, J.Sun, S.Lu, Y.Wang
Prolonged Mechanical Stretch Initiates Intracellular Calcium
Oscillations in Human Mesenchymal Stem Cells

Article (PDF Available) in [PLoS ONE](#) 9(10):e109378 · October 2014


Public Library of Science



Мезенхима –
эмбриональная
соединительная ткань

Stem cells -стволовые
недифференцированные
клетки

Система уравнений для колебаний кальция



[Dupont and Goldbetter (1989, 1994)]. Рассматриваются приток и отток кальция в клетку через плазматическую мембрану (константы скоростей v_1 и v_2 , соответственно); гормонально активируемое освобождение кальция из пула (скорость v_3); активный транспорт цитозольного кальция в пул, (v_4), освобождение кальция из пула, активируемое цитозольным кальцием (v_5); свободный отток кальция из пула в цитозоль (v_6). Модель состоит из двух дифференциальных уравнений

S_1 – концентрация Ca в цитозоле; S_2 – в гормонально чувствительном пуле

Выражения для скоростей:

$$\frac{dS_1}{dt} = v_1 - v_2 + v_3 - v_4 + v_5 + v_6$$

$$\frac{dS_2}{dt} = v_4 - v_5 - v_6$$




$$v_2 = k_2 S_1; v_4 = k_4 S_1;$$

$$v_5 = \frac{k_5 S_2 S_1^{nH}}{K_{0..5}^{nH} + S_1^{nH}}; v_6 = k_6 S_2$$



Kinetics the oscillations of Ca^{2+} in cytosol and in the store according to the model. Values of

parameters: ; $k_2 = 1; k_4 = 2; k_5 = 1; k_6 = 0.01; nH = 4; K_{0.5} = 3.1$

Приток Са $v_1 = 1.2$




При большей скорости притока колебания
приближаются к гармоническим



$$v_1 = 3$$

S.Vasaikar, A.K.Pafhi, B.Jayaram, J/Gomes. NeuroDNet - an open source platform for constructing and analyzing neurodegenerative disease networks. **Article (PDF Available)** in [BMC Neuroscience](#) 14(1):3 · January 2013. DOI: 10.1186/1471-2202-14-3 · Source: [PubMed](#)



Вопросы

- Какие колебательные процессы присутствуют в системе, которую Вы изучаете (хотели бы изучать)
- Эти колебания собственные или вынужденные?
- Если собственные. Где в Вашей системе обратная связь?
- Приведите пример колебательной системы, где важную роль играет запаздывание

- Внутриклеточные процессы (секунды-минуты)
- Жизненный цикл клетки (часы и более)
- Циклы клеточной популяции (часы, дни и более)